

คณิตศาสตร์

สำหรับ

วิศวกร 1

(Engineering Mathematics I)

- **Complex Analysis**
- **Vector Analysis**
- **Laplace Transform**
- **Fourier Transform**

สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ที่ศึกษาวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 และผู้ที่สนใจ

โดย.. สรายุทธ ทองกอบเหมือน • นภัทร วังนเทพินทร์

คณิตศาสตร์

สำหรับ

วิศวกรรม 1

..โดย..

สราวุธ ทองทองเหมือน
นัทธร ว้อนเทพินทร์



บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด

SKYBOOK COMPANY LIMITED

515/270-8 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 0-2958-1125-7, 0-2567-5119 โทรสาร. 0-2567-5105

E-mail: skybook1992@hotmail.com

www.skybook.co.th

“คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1”

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2546

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ห้ามคัดลอกถ่ายเอกสารหรือพิมพ์

หรือวิธีหนึ่งวิธีใดของหนังสือเล่มนี้ก่อนได้รับอนุญาต

จากบริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด

ราคา 150 บาท

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

รายชื่อ ทองกอบเหมือน

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1 -- กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2546.

284 หน้า

1. คณิตศาสตร์ --นักทรร วังนเทพินทร์, ผู้แต่งร่วม I. ชื่อเรื่อง

510.2462

ISBN: 974-389-380-6

S7901-30-10-03

จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย



บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
SKYBOOK COMPANY LIMITED
515/276-8 ถ.วิไล-ปทุมธานี อ.ปะทายสิทธิ์ อ.ชัยภูมิ จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 0-2958-1125-7, 0-2567-5119 โทรสาร. 0-2567-5105
E-mail: skybook1992@hotmail.com

www.skybook.co.th

พิมพ์ที่ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด

459 ซอยพินิจอุปถัมภ์ (ลาดพร้าว 48) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 0-2694-3010

คำนำ

หนังสือคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1 เล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 รหัส (0421- 0210) และ (1121- 0321) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อดสาற்றกรรมศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรอดสาற்றกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับปริญญาตรี และสถาบันที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงทฤษฎี และการนำมาใช้งานของตัวแปรเชิงซ้อน ทฤษฎีและการนำมาใช้งานของการวิเคราะห์เวกเตอร์ ทฤษฎีอนุกรมยูเรียร์และการนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปคลื่นไฟฟ้า ทฤษฎีของลาปลาซทรานฟอร์ม และการนำมาใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

ผู้เรียบเรียงได้เขียนด้วยภาษาที่อ่านและทำความเข้าใจง่าย และมีตัวอย่างที่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ง่าย จึงเหมาะสมกับผู้สนใจและผู้ที่จะศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนดังหนังสือเล่มนี้

สุดท้ายนี้ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อ่านและศึกษาทฤษฎีจากหนังสือเล่มนี้ และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และคำปรึกษา ขอขอบคุณอาจารย์นักทร วัจนเทพินทร์ ผู้เขียนร่วมที่ช่วยเรียบเรียงเนื้อหา และทีมงานสำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ ที่ได้ตรวจสอบต้นฉบับและดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ให้มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีคำผิดและข้อผิดพลาดบางประการ ผู้เรียบเรียงขอน้อมรับ และได้โปรดแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขแก่สำนักพิมพ์ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ผู้เรียบเรียง

สรายุธ ทองกอบเหมือน

นักทร วัจนเทพินทร์

สารบัญ

บทที่ 1 ทบทวนเวกเตอร์เบื้องต้น	9
1.1 บทนำ	9
1.2 ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์	9
1.3 พิกัดจุดเวกเตอร์	10
1.4 เวกเตอร์หน่วยในภาพ 3 มิติ	16
แบบฝึกหัดบทที่ 1	17
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1	18
 บทที่ 2 การคูณระหว่างเวกเตอร์กับเวกเตอร์	19
2.1 ผลคูณสเกลาร์ของเวกเตอร์	19
2.2 มุมแสดงทิศทางและโคไซน์แสดงทิศทางของเวกเตอร์	21
2.3 ทิศทางของเวกเตอร์บนเวกเตอร์	23
2.4 ผลคูณเวกเตอร์ของเวกเตอร์	26
2.5 ผลคูณของสามเวกเตอร์	30
2.6 สมการเส้นตรง และระนาบใน 3 มิติ	35
แบบฝึกหัดบทที่ 2	48
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2	51

บทที่ 3	อนุพันธ์ของเวกเตอร์	53
3.1	อนุพันธ์ของเวกเตอร์ธรรมดา.....	53
3.2	สูตรการหาอนุพันธ์ของเวกเตอร์	54
3.3	ความเร็วและความเร่ง	56
3.4	เส้นโค้งในอวกาศ	57
3.5	เวกเตอร์สัมผัสโค้ง และความยาวโค้ง	58
3.6	อนุพันธ์ย่อยของเวกเตอร์	62
3.7	ผิวโค้ง	65
	แบบฝึกหัดบทที่ 3	68
	เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3	70
 บทที่ 4	 เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนต์ และเคิร์ล	 71
4.1	สัญญากรเดล.....	71
4.2	เกรเดียนต์	71
4.3	อนุพันธ์ระบุทิศทาง	75
4.4	ไดเวอร์เจนต์	76
4.5	เคิร์ล	79
4.6	สูตรที่เกี่ยวกับสัญญากรเดล	80
	แบบฝึกหัดบทที่ 4	82
	เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4	84
 บทที่ 5	 การอินทิเกรตเวกเตอร์	 86
5.1	การอินทิเกรตเวกเตอร์ธรรมดา	86
5.2	การอินทิกรัลเชิงเส้น	88
5.3	การอินทิกรัลเชิงผิว	98
5.4	การอินทิกรัลเชิงปริมาตร	109
	แบบฝึกหัดบทที่ 5	111
	เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5	114

บทที่ 6	ทฤษฎีอินทิกรัล	116
6.1	ทฤษฎีของกรีนในระนาบ	116
6.2	ทฤษฎีไคเวอร์เจนท์ หรือทฤษฎีของเกาส์	125
6.3	ทฤษฎีของสต็อกส์	131
	แบบฝึกหัดบทที่ 6	138
	เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6	140
บทที่ 7	การวิเคราะห์เชิงซ้อน.....	141
7.1	บทนำ	141
7.2	จำนวนเชิงซ้อน	141
7.3	จำนวนเชิงซ้อนในระบบพิกัดฉาก	143
7.4	จำนวนคอนจูเกตเชิงซ้อน	144
7.5	พีชคณิตเชิงซ้อน	145
7.6	จำนวนเชิงซ้อนในระบบพิกัดเชิงขั้ว	148
7.7	รากของจำนวนเชิงซ้อน	155
	แบบฝึกหัดบทที่ 7	158
	เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7	160
บทที่ 8	ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อน	162
8.1	ฟังก์ชันเชิงซ้อน	162
8.2	ลิมิต และความต่อเนื่อง	164
8.3	อนุพันธ์	165
8.4	สมการคอชีรีแมนน์	167
	แบบฝึกหัดบทที่ 8	170
	เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8	171
บทที่ 9	ฟังก์ชันเชิงซ้อนเบื้องต้น.....	172
9.1	ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล	172
9.2	ฟังก์ชันตรีโกณมิติ	174

9.3 ฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิก	176
9.4 ฟังก์ชันลอการิทึม	177
9.5 ฟังก์ชันกำลังเชิงซ้อน	179
แบบฝึกหัดบทที่ 9	181
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9	183

บทที่ 10 การแปลงลาปลาซ 184

10.1 บทนำ	184
10.2 นิยามของการแปลงลาปลาซ	184
10.3 ตารางการแปลงลาปลาซ	186
10.4 คุณสมบัติการแปลงลาปลาซ	187
แบบฝึกหัดที่ 10.1-10.4	198
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.1-10.4	200
10.5 ฟังก์ชันเป็นคาบ	202
10.6 ฟังก์ชันกระโดดหนึ่งหน่วย	205
แบบฝึกหัดที่ 10.5-10.6	210
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.5-10.6	213
10.7 การแปลงผกผันลาปลาซ	215
แบบฝึกหัดที่ 10.7	228
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.7	231
10.8 การประยุกต์ใช้การแปลงลาปลาซกับวงจรไฟฟ้า	233
แบบฝึกหัดที่ 10.8	237
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 10.8	238

บทที่ 11 อนุกรมฟูเรียร์ 239

11.1 บทนำ	239
11.2 ฟังก์ชันคาบ	239
11.3 สูตรของออยเลอร์ฟูเรียร์	241

8 ดนิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1

แบบฝึกหัดที่ 11.1-11.3.....	246
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 11.1-11.3	248
11.4 ฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่	249
แบบฝึกหัดที่ 11.4.....	255
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 11.4	256
11.5 การขยายครึ่งคาบ	257
แบบฝึกหัดที่ 11.5.....	261
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 11.5	263
11.6 อนุกรมฟูเรียร์ในรูปจำนวนเชิงซ้อน	264
แบบฝึกหัดที่ 11.6.....	267
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 11.6	268
11.7 ฟูเรียร์อินทิกรัล	269
แบบฝึกหัดที่ 11.7	272
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 11.7	273

บทที่ 12 การแปลงฟูเรียร์.....274

12.1 ฟูเรียร์อินทิกรัลสำหรับรูปแบบจินตภาพ.....	274
12.2 การแปลงฟูเรียร์.....	274
12.3 การแปลงฟูเรียร์โคไซน์และไซน์	277
แบบฝึกหัดบทที่ 12.....	279
เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 12	280

ภาคผนวก281

บรรณานุกรม284



ทบทวนเวกเตอร์เบื้องต้น

1.1 บทนำ (Introduction)

เวกเตอร์เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนำไปประยุกต์แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในบางปัญหาอาจจะแก้ไขได้ด้วยทฤษฎีอื่นๆ ก็ตาม แต่วิธีใช้เวกเตอร์วิเคราะห์จะทำให้บรรลุผลสำเร็จและรวดเร็ว และสามารถเห็นภาพปริมาณทางฟิสิกส์ได้ การศึกษาวิเคราะห์เวกเตอร์เพื่อแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมจึงเป็นหนทางของวิศวกรนำไปวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรม เช่น ไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้า (Electrical field) และการหาค่าแรงที่เกิดจากสนามไฟฟ้า ความเร็ว (Speed) ความเร่ง (Acceleration) แรง (Force) ซึ่งสามารถระบุทิศทางได้ เป็นต้น

1.2 ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์ (Scalar and Vector)


ปริมาณในทางฟิสิกส์สามารถจำแนกปริมาณออกเป็น 2 ปริมาณคือ

1. ปริมาณสเกลาร์ (Scalar quantity) คือปริมาณที่มีแต่ขนาดไม่มีทิศทาง (Magnitude) เช่น มวล ความยาว เวลา อุณหภูมิ ปริมาตร เป็นต้น

2. ปริมาณเวกเตอร์ (Vector quantity) คือปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง ความเร็ว และความเร่ง เป็นต้น

สัญลักษณ์เวกเตอร์ จะเขียนแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ และมีลูกศรกำกับบนตัวอักษร เพื่อบ่งบอกว่าคือเวกเตอร์ เช่น $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$ เป็นต้น ดังรูปที่ 1.1

10 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1



รูปที่ 1.1 เวกเตอร์ $\vec{A}$

จากรูปที่ 1.1 ขนาดของเวกเตอร์ $\vec{A}$ จะเขียนแทนด้วย $|\vec{A}|$


ลักษณะของเวกเตอร์จะเขียนจากจุดเริ่มต้น (Initial point or origin) ของเวกเตอร์ ไปยังจุดปลายหรือจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ (Terminal point) เช่น เวกเตอร์ $\vec{AB}$ จะเขียนแทนด้วย เส้นตรงที่มีจุดเริ่มต้น A และสิ้นสุดที่ B ดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2 เวกเตอร์ $\vec{AB}$


1.3 พีชคณิตเวกเตอร์ (Vector algebra)

1. เวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ จะเท่ากันก็ต่อเมื่อมีขนาดเท่ากัน และมีทิศทางเดียวกัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ ดังรูปที่ 1.3




รูปที่ 1.3 เวกเตอร์เท่ากัน $\vec{A} = \vec{B}$

2. เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกัน เรียกว่า เวกเตอร์ลบ หรือนิเสธเวกเตอร์ เช่น เวกเตอร์ $\vec{A}$ และเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้าม คือ $-\vec{A}$ ดังรูปที่ 1.4



รูปที่ 1.4 เวกเตอร์ขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกัน $|\vec{A}| = -|\vec{A}|$

3. การบวกเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ จะได้ผลเท่ากับเวกเตอร์ $\vec{C}$ ดังรูปที่ 1.5



รูปที่ 1.5 ผลบวก $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$


กำหนด

$$\vec{A} = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\vec{B} = (b_1, b_2, b_3)$$

$$\vec{A} + \vec{B} = [(a_1 + b_1), (a_2 + b_2), (a_3 + b_3)]$$

4. การลบเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ จะได้ผลเท่ากับเวกเตอร์ $\vec{C}$ ดังรูปที่ 1.6



รูปที่ 1.6 ผลลบ $\vec{A} - \vec{B} = \vec{C}$ หรือ $\vec{A} + (-\vec{B}) = \vec{C}$

กำหนด

$$\vec{A} = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\vec{B} = (b_1, b_2, b_3)$$

$$\vec{A} - \vec{B} = [(a_1 - b_1), (a_2 - b_2), (a_3 - b_3)]$$


12 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1

ตัวอย่างที่ 1.1 กำหนดให้ $\vec{A} = (1, 2, 3)$ และ $\vec{B} = (4, 5, 6)$ จงหาค่า $\vec{A} + \vec{B}$ และ $\vec{A} - \vec{B}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\vec{A} + \vec{B} &= [(1 + 4), (2 + 5), (3 + 6)] \\ &= [5, 7, 9] \\ \vec{A} - \vec{B} &= [(1 - 4), (2 - 5), (3 - 6)] \\ &= [-3, -3, -3]\end{aligned}$$

5. เวกเตอร์ตำแหน่ง คือเวกเตอร์ที่มีตำแหน่งเริ่มต้นที่จุดศูนย์ (Origin) หรือจุดกำเนิด และจุดปลายอยู่ที่จุดใดๆ (x, y, z) เขียนแทนด้วย $\vec{r}$ ดังนั้น $\vec{r} = (x, y, z)$ ดังรูปที่ 1.7




รูปที่ 1.7 เวกเตอร์ตำแหน่ง

6. การหาขนาดของเวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ตำแหน่งคือมีจุดเริ่มต้นไม่ออกจากจุดศูนย์ เช่น ขนาดของเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้น A ไปถึงจุด B ในภาพ 3 มิติ จะเขียนแทนด้วย $|\vec{AB}|$ ดังรูปที่ 1.8

$$\text{กำหนด } A = (x_1, y_1, z_1)$$

$$B = (x_2, y_2, z_2)$$

$$\text{ดังนั้น ขนาดของเวกเตอร์ } \vec{AB} = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$



รูปที่ 1.8 ขนาดของเวกเตอร์จุด A ไป B เท่ากับ $|\vec{AB}|$

ตัวอย่างที่ 1.2 กำหนดจุด $A = (2, 5, 4)$ และ $B = (3, 3, 2)$ จงหาขนาดของเวกเตอร์ $\vec{AB}$

วิธีทำ ขนาดของเวกเตอร์ $\vec{AB}$ เขียนแทนด้วย $|\vec{AB}|$

$$\begin{aligned} |\vec{AB}| &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \\ &= \sqrt{(3 - 2)^2 + (3 - 5)^2 + (2 - 4)^2} \\ &= \sqrt{1 + 4 + 4} \\ &= 3 \end{aligned}$$

$\therefore$ ขนาดของเวกเตอร์ $|\vec{AB}| = 3$ หน่วย

7. ถ้า $\vec{A}$ เป็นเวกเตอร์ และ k เป็นสเกลาร์หรือค่าจำนวนจริงแล้ว ผลคูณระหว่างจำนวนจริง m และเวกเตอร์ $\vec{A}$ หมายถึงเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็น k เท่า และมีทิศทางตามเวกเตอร์ $\vec{A}$ เขียนแทนด้วย $m\vec{A}$

โดยที่ $k > 0$ และ $\vec{A} \neq \vec{0}$ $k\vec{A}$ มีทิศทางตามเวกเตอร์ $\vec{A}$
 $k < 0$ และ $\vec{A} \neq \vec{0}$ $-k\vec{A}$ มีทิศทางตรงข้ามเวกเตอร์ $\vec{A}$
 $k = 0$ และ $\vec{A} \neq \vec{0}$ $k\vec{A} = \vec{0}$


และถ้า $\vec{A} = (x, y, z)$ แล้ว $k\vec{A} = [kx, ky, kz]$

ตัวอย่างที่ 1.3 กำหนดให้เวกเตอร์ $\vec{A} = 2, 3, 4$ จงหาค่า $2\vec{A}$ และ $-3\vec{A}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} 2\vec{A} &= [2(2), 2(3), 2(4)] \\ &= [4, 6, 8] \\ -3\vec{A} &= [-3(2), -3(3), -3(4)] \\ &= [-6, -9, -12] \end{aligned}$$

ดังรูปที่ 1.9



รูปที่ 1.9 ผลคูณระหว่างเวกเตอร์ $\vec{A}$ กับสเกลาร์

14 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร 1

ตัวอย่างที่ 1.4 กำหนด $\vec{A} = (2, 3, 4)$, $\vec{B} = (1, -5, 3)$

จงหาค่า $2\vec{A} + 3\vec{B}$ และ $|2\vec{A} + 3\vec{B}|$

วิธีทำ

$$2\vec{A} = 2[2, 3, 4] = [4, 6, 8]$$

$$3\vec{B} = 3[1, -5, 3] = [3, -15, 9]$$

$$\therefore 2\vec{A} + 3\vec{B} = [7, -9, 17]$$


$$\begin{aligned}\text{และ } |2\vec{A} + 3\vec{B}| &= \sqrt{(7)^2 + (-9)^2 + (17)^2} \\ &= \sqrt{49 + 81 + 289} \\ &= \sqrt{419} = 20.47\end{aligned}$$

กฎทางพีชคณิตของเวกเตอร์ ถ้า $\vec{A}$, $\vec{B}$ และ $\vec{C}$ เป็นเวกเตอร์ m , n เป็นสเกลาร์แล้ว

1. $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$ กฎการสลับที่ของการบวก
2. $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$ กฎการจัดหมู่ของการบวก
3. $m\vec{A} = \vec{A}m$ กฎการสลับที่ของการคูณ
4. $m(n\vec{A}) = (mn)\vec{A}$ กฎการจัดหมู่ของการคูณ
5. $(m + n)\vec{A} = m\vec{A} + n\vec{A}$ กฎการกระจาย
6. $m(\vec{A} + \vec{B}) = m\vec{A} + m\vec{B}$ กฎการกระจาย

หมายเหตุ กฎทางพีชคณิตที่กล่าวไว้ข้างต้น จะใช้ได้เฉพาะการคูณเวกเตอร์กับสเกลาร์เท่านั้น ส่วนวิธีการคูณเวกเตอร์กับเวกเตอร์จะกล่าวในบทต่อไป

8. เวกเตอร์ขนานกันก็ต่อเมื่อ $\vec{A} \neq 0$ และ $\vec{B} \neq 0$ และถ้ามี m , n ซึ่งเป็นสเกลาร์คูณกับเวกเตอร์ $\vec{A}$ และ $\vec{B}$ โดยที่ $m\vec{A} = \vec{B}$ และ $n\vec{B} = \vec{A}$ จะเขียนแทนด้วย $\vec{A} // \vec{B}$ ดังรูปที่ 1.10



รูปที่ 1.10 เวกเตอร์ $m\vec{A} // \vec{B}$

9. เวกเตอร์หน่วย (Unit vector) คือเวกเตอร์ที่มีขนาด 1 หน่วย กำหนดให้ $\vec{A}$ เป็นเวกเตอร์ใดๆ